

○「授乳のお手本」とは？

コンビの哺乳びんは、母乳の飲みかたに近づけ、母乳に戻ることをめざしています。


そして、はじめてのママに安心して使ってほしい、飲むチカラがさまざまな赤ちゃんに対応してあげたい、その思いから、母乳の飲みかた・飲ませかたを研究して「授乳のお手本」を作りました。

コンビが考える「哺乳運動をうながし、健全な口腔発育をサポートする」ことはもちろん、母乳育児を助ける哺乳補助用品として、飲む初心者の赤ちゃんと、与える初心者のママの「お手本」となることをめざしています。



○お手本になるために…


100mlマークのひみつ



授乳方法で「混合授乳」という言葉を聞いたことがあると思います。母乳育児を中心に考えた場合は、「母乳を飲ませた後に、たりない分を粉ミルクで補う」という方法をおすすめします。まずは直接おっぱいから母乳をあげることが重要です。ママのおっぱいは赤ちゃんが飲むことで「必要とされる量」を感じて母乳を生産するので、赤ちゃんがおっぱいを吸う時間となるべく多くしましょう。その後でたりない分を粉ミルクで補ってあげる場合の必要量は、100mlを大きく超えることはあまりないです。目盛にある100mlマークには、母乳育児成功の願いが込められているのです。

赤ちゃんの授乳のメカニズム

赤ちゃんには、本能的におっぱいを飲むことができるチカラが備わっています。「授乳のお手本」には、赤ちゃんの持つチカラを無理なく引き出すためのたくさんの工夫がつまっています。



○乳首のこと

「授乳のお手本 Lico」は、はじめてのママが使いやすいようにシンプルな構造になっています。

そのため、飲む量をコントロールする流量に関しては赤ちゃんが一般的に飲める流量で設定し、流量調節機能はありません。

カタチ　おっぱいの飲みかたに誘導できるよう

「授乳のお手本」がこだわったカタチ。それは、しっかりと「舌」が動かせるカタチであることです。赤ちゃんのお口の動きは、とても繊細かつダイナミック。この動きがママのおっぱいを飲む時に重要な役割をします。人工の乳首を使った時に、おっぱいの飲みかたを忘れてしまうことがないように、できる限り同じ動きができるこだわりをめざしました。そのため、赤ちゃんのお口に含ませてあげるだけで自然に正しくくわえかたができるよう、角度を付け、上下非対称のカタチにしました。また、乳首先端のカタチも、サイズによって変えました。

サイズ　赤ちゃんの個性と成長にあわせて

赤ちゃんのお口は、成長とともに発達していきます。そのお口の発達にあわせて、2サイズ用意しました。ママのおっぱいはひとつなのに?と思われるでしょう。でも、ママのおっぱいも、赤ちゃんの飲みかたや成長・発達にあわせて形や栄養が変化していくのです。人工の乳首では、その柔軟なママのおっぱいをまねることはできません。だから、赤ちゃんの成長にあわせた複数のサイズがあるのです。

穴の数　赤ちゃんのお腹に負担がないよう

母乳と同じように感じてほしいから、乳孔の数もひとつではなく3つにしました。「3つだとたくさん出てしまうのでは?」と思うかもしれません。でも大丈夫。ひとつひとつの穴をとても小さくし、少しづつゆっくり飲めるようにしてあります。さらにのどに直接あたりにくく、唾液と混ざりやすくなります。

| | 0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | 18ヶ月 |
|-------|--------------|-------|-----|------|
| SSサイズ | 0ヶ月～1.5ヶ月頃まで | | | |
| Sサイズ | 0ヶ月～3ヶ月頃まで | | | |
| Mサイズ | 2・3ヶ月～18ヶ月まで | | | |

1.5ヶ月頃までは、飲む赤ちゃんにも飲ませるママにとっても、授乳トレーニング期間です。

1.5ヶ月頃までの赤ちゃんの飲む行動は、反射的なものなので飲む量のコントロールも上手ではありません。必要以上の量を与えないよう、注意してあげましょう。

※食欲に応じて飲む量をコントロールできる「自律授乳」は2・3ヶ月の頃に可能になります。

○母乳のこと

母乳育児成功の「知恵袋」

「授乳のお手本」でも絶対にかなわないのが、ママの母乳です。そして母乳がどんなにすばらしいものか、それは十分理解されていることでしょう。ここでは母乳育児成功のポイントをちょっとだけ…。考えすぎず、おおらかな気持ちで母乳育児を楽しんでください。

母乳育児成功のポイント

- 粉ミルクを与える際は、まとめて大量に飲ませない
- 左右のおっぱいに赤ちゃんの刺激を与えて、母乳を作り出すように働きかける
- 母乳は赤ちゃんのほしがるサインに応じて、回数を気にせず飲ませる
- 完全ミルクの場合も、少量を3時間おきに与え、まとめて飲ませない
- 母乳育児に不安を感じたら、一人で悩まず専門家に相談する



おっぱいが
ほしい
赤ちゃんの
サイン

泣くだけ
じゃない

赤ちゃんは、おなかがさいたら泣くということはよく知られていますが、それ以外にもサインがあります。お口がおっぱいを吸うように動いたり、おっぱいを吸っているような音がしたり、おててをお口に持っていたりなど。こんな赤ちゃんのサインにあわせてまずはおっぱいを吸わせてみましょう。

コンビ株式会社

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などご相談は、コンシユーマープラザにて対応いたします。

コンシユーマープラザ (Customer Service Center) 受付時間：9:30～17:00 (日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

■総合受付(各種ご相談窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご依頼/各種ご相談/その他 TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ/ご注文 TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

*コンシユーマープラザホームページ www.combi.co.jp/soudan ©2017 Combi Corporation

■ホームページ
■オンラインショップ
■対象出産・製品コム情報サイト
www.combi.co.jp
shop.combi.co.jp
www.combibaby.com

164666000

| コンビ テテオ 授乳のお手本 LICO 哺乳びん プラスチック製 240ml Sサイズ乳首付 | | |
|--|---------------|-----|
| 品名: ほ乳びん(プラスチック製) | | |
| 部品名 | 材料の種類 | 原産国 |
| フード | | |
| キャップ | ポリプロピレン | 日本 |
| びん | | |
| ニップルピン | | |
| 中ぶた | 熱可塑性エラストマー | |
| 乳首 | 合成ゴム(シリコーンゴム) | |
| 乳首の吸い穴の形状および穴数 | 丸穴・3穴 | |
| びんの容量 | 240ml(最大容盛量) | |
| 消毒・除菌方法 | 煮沸・電子レンジ・殺菌液 | |

取り扱い上の注意
●使用後は、洗浄した後、煮沸、電子レンジで加熱する前に消毒または除菌を行ってください。●火のそばに置くと軟化したり変形するおそれがあります。●硬めのプラスチックが溶け、表面に傷がついたり、不透明になることがあります。

teteo
こんなにコンパクトで
大きさ
240ml
Sサイズ乳首付

0～3ヶ月
頃まで

授乳のお手本。
LICO



- 本製品をご使用の場合は、テテオ 授乳のお手本 哺乳びん「LICO専用」バーツをご使用ください。
- 4段階流量調節機能はありません。

コンビ株式会社
TEL.(048) 797-1000

0～18ヶ月の飲む量に対応できる
※一般的な卒乳時期の目安

コンビ テテオ 授乳のお手本 LiCO

哺乳びん プラスチック製 240ml Sサイズ乳首付

取扱説明書

● 使用目的と注意事項

この製品は、お子さまへの授乳や他の飲み物を与えるためのものです。それ以外の目的では使用しないでください。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、使用方法を正しく理解してから製品をお使いください。

また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

■ 安全にご使用いただくために以下の注意をお守りください。

ヤケドやケガのおそれがあります。下記の点には十分ご注意ください。

- お湯を入れる際、哺乳びんが熱くなります。清潔なタオルを巻くなどしてお使いください。●お子さまのそばで調乳することはおやめください。●ミルクの温度を必ず確認してから授乳してください。●調乳時は、哺乳びんを上下に振らないでください。乳孔からミルクがこぼれ出るおそれがあります。●哺乳びんの装着が不完全ですと乳首がキャップから抜けたり飲みものが漏れることができます。●中ぶたをセットした状態で哺乳びんを振ったり倒したりすると、高温のお湯または飲み物により哺乳びんの内圧が高まり、漏れやふき出しのおそれがあります。●中ぶたを使用した場合でも、横向きや逆さになると漏れることができます。●落したり、倒すなど衝撃を与えないでください。製品が破損するおそれがあります。●電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になります。

- お子さまは思ひぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところでお使いください。●お子さまの手の届かないところに保管してください。●火のそばに置かないでください。軟化したり、変形するおそれがあります。●びんは、お使いになるたびに、破損・変形が生じないことを確認してください。万一、生じている場合はすぐに使用を中止してください。びんが割れて、ヤケドやケガをするおそれがあります。●フードをつかんで持ち上げたり、振るなどするとフードだけがはずれ、哺乳びんが落下するおそれがあります。

■ 必ず洗浄し、消毒または除菌したものをお使いください。

はじめてご使用になる前にも、必ず洗浄し、消毒または除菌をしてください。

● 洗浄の方法

● 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。

● 授乳後は、すぐに分解してゆるま湯につけ、やわらかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤でよく洗浄してください。

● 乳首は、コンビの乳首専用の洗浄ブラシで内側を洗い、乳孔や空気孔はよくもみ洗いし、付属のニップルピンでお手入れしてください。

● びんの内側は、コンビの哺乳びん専用ブラシでよく洗浄してください。

テテオ乳首専用ニップルピンの使いかた

乳孔や空気孔がつまつたり密着すると乳首がつぶれたり、飲みにくくなる原因となります。洗浄と授乳の際に、付属のニップルピンでお手入れしてください。

乳孔の場合



3つの乳孔に細いピン側を軽く回し


空気孔の場合



空気孔に太いピン側を軽く回しながらやさしく差し込みます。

- 授乳後はすぐに洗浄してください。カビや雑菌が繁殖するおそれがあります。
- ガラス哺乳びん用ナイロンブラシ、たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナリオンわたし、金属たわしなどは使用しないでください。製品の表面に傷がついたり、印刷がはがれたり、不透明になるおそれがあります。
- アルカリイオン整水器などで作る酸性水は使用しないでください。印刷がはがれるおそれがあります。
- 付属のニップルピンはお子さまの手の届かないところに保管してください。誤飲やケガの原因となります。

● 各部のなまえ



● 消毒・除菌の方法

- 洗浄後は消毒または除菌をしてください。
- 煮沸・薬液・電子レンジによる消毒または除菌ができます。

煮沸消毒について

たっぷり水を入れた大きい鍋にびんを入れ、沸騰させます。びんの中に水が入るようにしてください。沸騰したら、その他の部品を入れ、2~3分間煮沸してください。

薬液消毒・除菌について

哺乳用品用の薬剤をお使いください。詳しくは各薬剤の使用方法に従ってください。薬剤の成分により、シリコーンゴム製の部品が白く変色したり、びんの印刷色が薄くなることがあります。

電子レンジ除菌について

哺乳用品用の除菌用具をお使いください。詳しくは各用具の使用方法に従ってください。

● びんを煮沸するときは、水の状態から入れてください。急激な温度変化は破損・割れの原因となります。

● 3分以上煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く痛めます。

● 小さい鍋で煮沸すると、各部品が鍋のうちに密着して変形するおそれがあります。

● 煮沸の際は、アルカリイオン整水器などで作る酸性水は使用しないでください。印刷がはがれるおそれがあります。

● 長時間蒸煮に浸したり、薬液の濃度が濃いとシリコーンゴム製の部品が劣化することがあります。

● 電子レンジ除菌および煮沸消毒後のびんは、高温の状態から急冷しないでください。破損・割れの原因となります。

● 漂白はしないでください。びんが変色したり、印刷がはがれる・薄くなるなどのおそれがあります。

● びんを煮沸するときは、水の状態から入れてください。急激な温度変化は破損・割れの原因となります。

● 3分以上煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く痛めます。

● 小さい鍋で煮沸すると、各部品が鍋のうちに密着して変形するおそれがあります。


● 煮沸の際は、アルカリイオン整水器などで作る酸性水は使用しないでください。印刷がはがれるおそれがあります。

● 長時間蒸煮に浸したり、薬液の濃度が濃いとシリコーンゴム製の部品が劣化することがあります。

● 電子レンジ除菌および煮沸消毒後のびんは、高温の状態から急冷しないでください。破損・割れの原因となります。

● 漂白はしないでください。びんが変色したり、印刷がはがれる・薄くなるなどのおそれがあります。

● 乳首について



▲ 授乳の際は、このマークが上になるようにしてください。
※イラストはSサイズです。


座板にサイズが表示されています。

「テテオ 授乳のお手本 LiCO 乳首」には、2種類のサイズがあります。

| サイズ | 乳孔の形状・数 | 対象月齢 |
|-----|---------|--------------|
| S | 丸穴・3穴 | 0ヵ月～3ヵ月頃まで |
| M | 丸穴・3穴 | 2・3ヵ月～18ヵ月まで |

● 中ぶたについて

- 外出時など中にお湯を入れて持ち運ぶ際は、漏れ防止のため、中ぶたを哺乳びんの上にのせ、ご使用ください。中ぶたは「上面」の文字を上にして、しっかりとキャップを締めてください。※授乳時には取りはずしてください。



● 注意

- 中ぶたは「上面」の文字を上にしてご使用ください。装着が不完全で漏れてヤケドをするおそれがあります。● 中ぶたをセットした状態で哺乳びんを振ったり、倒すなどすると、高温のお湯または飲み物により哺乳びんの内圧が高まり、漏れやふき出しがあります。● 中ぶたを使用した場合でも、横向きや逆さになると漏れることができます。バッグなどが濡れたり、高温のお湯や飲み物の場合は、横向きや逆さにしてください。

● 授乳の方法

● 調乳は、必ず清潔な手で行ってください。

● 調乳の詳しい方法は、各粉ミルクの調乳方法に従ってください。

● 調乳には、一度沸騰させた、70°C以上のお湯をお使いください。

● お湯を入れる際、哺乳びんは熱になります。清潔なタオルを巻くなどしてお使いください。

組み立てかた

1. キャップに乳首を取り付けます。



2. びんの口に、キャップをしっかりと締めます。



※ 調乳・授乳の際に
は、乳首とキャップ
が正しく装着され
ているかご確認く
ださい。

- びんを煮沸するときは、水の状態から入れてください。急激な温度変化は破損・割れの原因となります。
- 3分以上煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く痛めます。
- 小さい鍋で煮沸すると、各部品が鍋のうちに密着して変形するおそれがあります。
- 煮沸の際は、アルカリイオン整水器などで作る酸性水は使用しないでください。印刷がはがれるおそれがあります。
- 長時間蒸煮に浸したり、薬液の濃度が濃いとシリコーンゴム製の部品が劣化することがあります。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後のびんは、高温の状態から急冷しないでください。破損・割れの原因となります。
- 漂白はしないでください。びんが変色したり、印刷がはがれる・薄くなるなどのおそれがあります。

● 調乳後はなるべく早めに授乳してください。

授乳適温の確認

腕の内側にミルクを2~3滴たらして、やや温かく感じる程度の適温になっているか確認してください。

飲ませるときは

お子さまをだっこして、飲ませてください。



乳首の向き

乳首の▲マークが上になるように授乳してください。

授乳時間は

15~20分が目安です。母乳と同じ程度の時間で授乳することをお勧めします。

- ミルクの温度を必ず確認してから授乳してください。ヤケドをするおそれがあります。
- 授乳前に、乳首やキャップが正しく装着されているか確認してください。装着が不完全で漏れや乳首がはがれる原因となります。

ワンポイント

- お子さまの上唇が巻き込まれず、はつきり見えるようくわえていることを確認してください。
- 乳首の▲マークが上になるように授乳してください。
- 乳首の乳孔や空気孔は材質の特性上、つまつたり密着して機能しなくなることがあります。付属のニップルピンでお手入れして、つまつたり密着したまま使用しないよう注意してください。